

ATOPA



Толерантність до вірусу пожовтіння турнепсу



Відмінне здоров'я



Відмінна
посухостійкість

NORDDEUTSCHE PFLANZENZUCHT
Ми сприєммо зростанню якості



- високоврожайний гібрид, в якому поєднується динамічний початковий ріст, стрімке відновлення весною та середньопізнє дозрівання
 - завдяки потужній кореневій системі придатний до вирощування як на легких, так і важких типах ґрунтів
 - середньовисокий гібрид з розлогим типом габітусу, що покращує гомогенність та підвищує стійкість до вилягання
 - висока стійкість до фомозу, склеротиніозу, альтернаріозу та вертициліозу
 - висока регенеративна здатність після стресів

Тип ґрунту	легкі, середні та важкі ґрунти			
Обробіток ґрунту	оранка, глибоке рихлення, мінімальній обробіток			
Строки посіву*	Ранній непридатний	Оптимальний	Пізній	Дуже пізній
Рекомендована густота сходів в залежності від строку посіву і ширини міжряддя**	Суцільний висів на 15 см	35 - 40 рослин/м ²	45 - 50 рослин/м ²	50 - 55 рослин/м ²
	Точний висів на 30 см відстань між рослинами	30 - 33 рослин/м ² 11 - 10 см	37 - 45 рослин/м ² 9 - 7,5 см	47 - 52 рослин/м ² 7 - 6,5 см
	Точний висів на 45 см відстань між рослинами	22 - 25 рослин/м ² 10 - 9 см	32 - 37 рослин/м ² 7 - 6 см	37 - 39 рослин/м ² 6 - 5,7 см

* – орієнтовні строки посіву для регіонів України вказано в таблиці 1 на с.

** — вказані норми висіву є актуальними за умови отримання сходів на 4-7 добу після посіву

44

Бовтачук Руслан, провідний агроном відділку

АХ Епіцентр АгроС

Гібриди NPZ Україна вирощуємо більше 10 років. В поточному сезоні надали перевагу гібриду АТОРА через високий потенціал урожайності та здатність адаптуватись до різних погодних умов восени та навесні. Сівбу провели в оптимальні та пізні строки. Зауважу, що посіви гібриду АТОРА з різними строками сівби не відрізнялися за розвитком. Рослини прекрасно реагували на внесення морфорегуляторів восени. У зиму ріпак увійшов у фазі 8 листків з добре розвиненою розеткою та кореневою шийкою 0,8 см. Цей гібрид має міцно розвинений стрижневий корінь, який дає можливість рослині краще використовувати поживні речовини та продуктивну вологу у весняно-літній період. Стан гібриду АТОРА після виходу з зими показує, що ми на правильному шляху.

Область: Хмельницька

Північний кластер



Морфо-біологічні характеристики

Господарства за врожайністю озимого ріпаку АТОРА, ц/га (2020)

Чернігівська	ПрАТ Іржавецька	◆ 46,1
Волинська	ТОВ Волинь Нова	◆ 44,0
Вінницька	ФГ Велес Віта	◆ 43,0
Київська	ФГ Колосок	◆ 43,0
Дніпропетровська	ФГ Чайка	◆ 42,0
Івано-Франківська	ФГ Прометей	◆ 42,0
Хмельницька	ТОВ С-Іванна	◆ 41,0
Чернігівська	ФГ Вітчизна Тиниця	◆ 40,9
Чернігівська	ФГ Горизонт	◆ 40,0